



Prefeitura Municipal de  
São Cristóvão do Sul/SC

Processo Seletivo  
Edital 004/2015

 22 de novembro

 2h de duração

 40 questões

Caderno de  
**PROVA**

**Médico/a**

Assinatura: \_\_\_\_\_

#### **Informações**

A prova escrita objetiva é composta por 12 (doze) questões de conhecimentos gerais e 28 (vinte e oito) de conhecimentos específicos.

Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas, sendo apenas uma única correta.

A prova escrita objetiva consta de um caderno de prova com as questões e uma folha de respostas.

O candidato é responsável pela conferência dos dados. **Qualquer divergência deve ser imediatamente comunicada ao fiscal de sala.**

#### **Importante**

Para o preenchimento da folha de respostas, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

O caderno de prova e a folha de respostas só poderão ser entregues 1 (uma) hora após o início da prova. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar a prova e a folha de respostas ao mesmo tempo e, após, devem assinar a ata e lacrar o envelope de provas.

No final do caderno de prova há espaço para registrar e destacar o gabarito.

Ao encerrar a prova, entregue-a juntamente com a folha de respostas, ambos devidamente assinados, para o fiscal de sua sala.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

## CONHECIMENTOS GERAIS – 12 QUESTÕES

Texto para as questões 1 e 2

*"Ressaltamos a necessidade da opção pela abertura da prisão à sociedade e, reciprocamente, da sociedade à prisão. Um dos elementos mais negativos das instituições carcerárias, de fato, é o isolamento do microcosmo prisional do macrocosmo social, simbolizado pelos muros e grades. Até que não sejam derrubados, pelo menos simbolicamente, as chances de "ressocialização" do sentenciado continuarão diminutas. Não se pode segregar pessoas e, ao mesmo tempo, pretender a sua reintegração. Todavia, a questão é mais ampla e se relaciona com a concepção de "reintegração social", conceito que decididamente preferimos aos de "ressocialização" e "tratamento". "Tratamento" e "ressocialização" pressupõem uma postura passiva do detento e ativa das instituições: são heranças anacrônicas da velha criminologia positivista que tinha o condenado como um indivíduo anormal e inferior que precisava ser (re)adaptado à sociedade, considerando acriticamente esta como "boa" e aquele como "mau". Já o entendimento da reintegração social requer a abertura de um processo de comunicação e interação entre a prisão e a sociedade, no qual os cidadãos reclusos se reconheçam na sociedade e esta, por sua vez, se reconheça na prisão".*

RESSOCIALIZAÇÃO OU CONTROLE SOCIAL: Uma abordagem crítica da "reintegração social" do sentenciado (Alessandro BARATTA. Universidade de Saarland; Alemanha Federal).

1. Quanto o autor diz que "o entendimento da reintegração social requer a abertura de um processo de comunicação e interação entre a prisão e a sociedade, no qual os cidadãos reclusos se reconheçam na sociedade e esta, por sua vez, se reconheça na prisão", ele faz uma análise que denota, exceto:
  - a) Reciprocidade
  - b) Mutualidade
  - c) Unilateralidade
  - d) Correlação
2. O trecho "são heranças anacrônicas da velha criminologia positivista" remete ao significado de **anacrônico**, o qual tem sinônimos corretos na alternativa:
  - a) Obsoleto, retrógrado, antiquado
  - b) Cronológico, arcaico, adequado
  - c) Imutável, permanente, rudimentar
  - d) Elementar, contemporâneo, conservador
3. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras escritas de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que entra em vigência oficial a partir de 2016:
  - a) Vôo – Feiúra – Enjôo
  - b) Polo – pelo – contrassenso
  - c) Neossimbolista – microondas – sub-bibliotecário
  - d) Ex-aluno – Inter-estelar – Pára-quadras
4. Analise os grupos de palavras abaixo e responda:
  - I. Heróico – Assembleia – Jiboia
  - II. Heroico – Européia – Jóia
  - III. Europeia – Assembleia – Joia
  - IV. Céu – herói – chapéu
  - V. Chapéu – cinquênta – idéia
  - VI. Ideia – véu – cinquenta

Quais as alternativas que estão em consonância com o que prevê o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que entra em vigência oficial a partir de 2016:

- a) II, III e V
  - b) Somente II
  - c) Somente IV
  - d) III, IV e VI
5. Em relação às normas de concordância verbal e nominal, está adequadamente escrita a sentença:
- a) Deve haverem pistas para encontrar o suspeito.
  - b) Fazia cinco dias que eu não a via.
  - c) Os funcionários não podem cometerem mais erros.
  - d) São questões difíceis de responderem.
6. Assinale a alternativa em que a pontuação está usada corretamente na frase de Pedro Bial:
- a) O que é amar! Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.
  - b) O que é amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer, eu quero é viver intensamente.
  - c) O que é amar? Amar, é olhar para dentro de si mesmo, e dizer: eu quero é viver intensamente.
  - d) O que é amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.

7. Qual o valor de t na equação abaixo?

$$2t^2 = -8t$$

- a) -4
- b) -3
- c) -2
- d) 2

8. Qual o valor de r na matriz abaixo?

$$\det M \begin{bmatrix} 4 & 16 \\ 2 & r \end{bmatrix} = 0$$

- a) 4
- b) 6
- c) 8
- d) 10

9. Henrique fez um empréstimo a juros simples de R\$ 5.000,00 e pagou em 120 dias. Se ele pagou R\$ 200,00 de juros, qual foi a taxa de juros mensal que o banco cobrou?

- a) 4%
- b) 3%
- c) 2%
- d) 1%

10. Analise as notícias abaixo sobre economia:

- I. *O crescimento da economia brasileira em 2012 e 2013 foi revisado agora em novembro desse ano para cima após a incorporação de novas informações provenientes de pesquisas anuais elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE tem até dois anos de defasagem para divulgar os dados definitivos da economia brasileira;*
- II. *No ranking de países mais ricos do mundo divulgado agora em novembro pela Global Finance Magazine, o critério utilizado foi o PIB per capita corrigido pela paridade de poder de compra. Nesses critérios, o Brasil está no grupo dos 20 países mais ricos do mundo.*

Quanto à essas afirmações:

- a) Ambas estão corretas.
- b) Ambas estão incorretas.
- c) Somente a afirmação I está correta.
- d) Somente a afirmação I está incorreta.

11. Trata-se de um país localizado no Oriente Médio, que atualmente enfrenta uma guerra civil:

- a) Espanha
- b) Turquia
- c) Bulgária
- d) Síria

12. Aleijadinho foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Nascido em Minas Gerais, por volta de 40 anos de idade, começou a desenvolver uma doença degenerativa nas articulações.

O verdadeiro nome de Aleijadinho era:

- a) José Maria Lopes Azevedo
- b) Fernando Arruda da Cunha
- c) Antônio Francisco Lisboa
- d) Cavalcante Lopes de Moraes

<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 28 QUESTÕES</b>
--

13. Constituem-se diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), exceto:

- a) Promoção da cidadania e inclusão das pessoas privadas de liberdade por meio da articulação com os diversos setores de desenvolvimento social, como educação, trabalho e segurança.
- b) Controle e/ou redução dos agravos mais frequentes que acometem a população privada de liberdade no sistema prisional.
- c) Promoção de iniciativas de ambiência humanizada e saudável com vistas à garantia da proteção dos direitos dessas pessoas.
- d) Intersetorialidade para a gestão integrada e racional e para a garantia do direito à saúde.

14. Os serviços de saúde nos estabelecimentos prisionais serão conformados de acordo com a população prisional e o funcionamento dos serviços, classificando-se em quantas faixas?

- a) Duas faixas
- b) Três faixas
- c) Quatro faixas
- d) Cinco faixas

15. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, dentre outros nos termos seguintes, não incluindo:

- a) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
- b) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
- c) A pena, quando possível será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.
- d) Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.

16. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, exceto:
- Fundo de garantia do tempo de serviço.
  - Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
  - Décimo terceiro salário com base na remuneração parcial ou no valor da aposentadoria.
  - Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.
17. "Nas empresas de mais \_\_\_\_\_ empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores".  
A alternativa que completa corretamente a frase acima é:
- 50 empregados
  - 100 empregados
  - 150 empregados
  - 200 empregados
18. De acordo com o Plano Operativo Estadual de Saúde no Sistema Penitenciário, de maio de 2004, Santa Catarina possui \_\_\_\_\_ unidades prisionais.  
Complete a frase com a alternativa correta:
- 29
  - 30
  - 31
  - 32
19. A Constituição Federal, capítulo I, "Dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos", afirma:
- Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação*
  - A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;*
  - É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;*
  - O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;*
  - A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;*
  - É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;*
- Estão corretas as alternativas I, II, IV, VI.
  - Todas estão corretas.
  - Somente a VI está incorreta.
  - Estão corretas as alternativas I, III, IV, V e VI.
20. Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), as unidades prisionais que contenham até 100 (cem) custodiados, o serviço de saúde têm funcionamento mínimo de:
- 6 horas semanais
  - 12 horas semanais
  - 20 horas semanais
  - 30 horas semanais
21. Segundo a Portaria nº 482, de 1º de abril de 2014, a Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I terá composição mínima de:
- 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
  - 1 (um) cirurgião-dentista; 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.

- c) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 2 (dois) técnicos de enfermagem/auxiliares de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
- d) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 3 (três) técnicos de enfermagem/auxiliares de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.

22. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

- I. *Os presos maiores de sessenta anos;*
- II. *Os analfabetos;*
- III. *Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.*

Estão corretos os itens:

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e III
- d) I, II e III

23. Nos casos de Diarréia, os antibióticos ficam reservados para os casos de cólera, manifestações sistêmicas da infecção por *Clostridium difficile*, *Shigella*, *Salmonella* em crianças menores de três meses de idade ou imunodeprimidos e outros raros casos em que após a reidratação e normalização do equilíbrio acidobásico mantém-se o comprometimento do estado geral, sugerindo translocação bacteriana ou parasitas específicos.

Nos casos de Amebíase (*Entamoeba histolytica*), a orientação para tratamento de primeira opção, segundo o Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde é:

- a) Tinidazol, 2g, VO, para adultos, após uma das refeições, durante dois dias, para formas intestinais. Formas extraintestinais: 50mg/kg/dia, durante dois ou três dias, a depender da forma clínica. Em formas graves, utilizar a mesma dosagem das formas leves, por três dias. Em crianças, a dosagem recomendada é 50mg/kg/dia.
- b) Metronidazol em Adultos: 2g; Crianças: 30mg/kg/dia, não ultrapassando o máximo de 2g/dia.
- c) Sulfametoxazol + Trimetropima 500mg de dose de ataque, mais 10mg/kg/dia.
- d) Formas intestinais: Secnidazol – Adultos: 2g, em dose única. Crianças: 30mg/kg/dia, VO, não ultrapassando o máximo de 2g/dia.

24. A classificação de risco mais simples que permite ter um prognóstico seguro de Pneumonia Adquirida na Comunidade considera sinais de gravidade agudos e idade do doente. Tal classificação denominada de CRB-65 trata-se de um escore baseado em quatro variáveis, sendo elas:

- a) C: Presença de Confusão Mental; R: Frequência Respiratória maior ou igual á 30 irpm; B: Pressão arterial sistólica menor que 90mmHg ou diastólica menor ou igual a 60mmHg; 65: Idade maior que 65 anos.
- b) C: Presença de Cardiopatias; R: Frequência Respiratória maior ou igual á 25 irpm; B: Pressão arterial sistólica menor que 90mmHg ou diastólica menor ou igual a 60mmHg; 65: Idade maior que 65 anos.
- c) C: Presença de Cardiopatias; R: Frequência Respiratória maior ou igual á 30 irpm; B: Pressão arterial sistólica menor que 80mmHg ou diastólica menor ou igual a 60mmHg; 65: Idade maior ou igual á 65 anos.
- d) C: Presença de Confusão Mental; R: Frequência Respiratória maior ou igual á 25 irpm; B: Pressão arterial sistólica menor ou igual á 90mmHg ou diastólica menor ou igual a 60mmHg; 65: Idade maior ou igual á 65 anos.

25. Os pacientes com asma persistente que estão bem controlados com o uso da medicação como corticoide inalatório possuem risco diminuído de exacerbações. É importante lembrar que a grande maioria das exacerbações pode ser tratada na Unidade de Saúde. Leia as afirmativas com relação aos fatores de risco para exacerbação de uma crise asmática e assinale a alternativa correta:

- I. *História de má adesão ao tratamento de anti-inflamatório de manutenção.*
- II. *Utilização anual ou semestral de corticóide oral.*
- III. *Três ou mais visitas a serviços de pronto-atendimento ou duas ou mais hospitalizações por asma aguda nos últimos 12 meses.*
- IV. *Uso de quatro ou mais tubos de aerossol dosimetrado (bombinha) de broncodilatador/mês.*

- a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
26. Durante a avaliação de um paciente com Disúria, o Médico deve focar durante a realização do exame físico a presença de Sinal de Giordano. Diz-se então, que Sinal de Giordano positivo refere-se á:
- Dor no hipocôndrio direito à palpação do hipocôndrio esquerdo (irradiada).
  - Dor no hipocôndrio esquerdo à palpação do hipocôndrio direito (irradiada).
  - Dor no flanco a punho percussão leve.
  - Dor no flanco à palpação profunda.
27. Em adolescentes com Infecção do Trato Urinário, os sinais e sintomas mais comumente observados são:
- Disúria, frequência e urgência, desconforto abdominal, urina fétida, febre.
  - Disúria, frequência e urgência, dor abdominal, padrões miccionais anormais (incluindo incontinência e enurese), constipação, urina fétida, febre.
  - Dor abdominal, vômitos, diarreia, constipação, padrões miccionais anormais, urina fétida, febre, retardos no crescimento.
  - Hipotermia, hipertemia, retardos no desenvolvimento, vômitos, diarreia, irritabilidade, letargia, icterícia, urina fétida, sepsse.
28. É caracterizada por uma celulite superficial, observada mais frequentemente acima dos 60 anos, e tem como principal agente o *Streptococcus* beta-hemolítico do grupo A. Afeta principalmente os membros inferiores, e a penetração ocorre por soluções de continuidade como as micoses interdigitais:
- Impetigo Bolhoso
  - Impetigo não Bolhoso
  - Erisipela
  - Herpes Zoster
29. No Herpes genital surgem vesículas agrupadas, dolorosas, na região perigenital ou anorectal. Pode ter sintomas sistêmicos, como cefaleia, febre, mal-estar e pode ser recidivante, ocorre após:
- 2 – 3 dias do contato
  - 5 – 10 dias do contato
  - 15 – 20 dias do contato
  - 30 dias do contato
30. O Eritema Infeccioso é causado pelo parvovírus B19 e transmitido por via respiratória ou por meio da placenta de mães infectadas, podendo levar à hidropsia fetal. Tem período de incubação de aproximadamente 14 a 21 dias. Pode evoluir com:
- Sintomas prodrômicos leves, como febre, cefaléia, mialgia. O exantema inicia na face, nas bochechas, acompanhado de palidez perioral, configurando a chamada "face esbofeteadas".
  - Sintomas prodrômicos como febre baixa e mal-estar. O exantema inicia na face, couro cabeludo ou tronco e evolui com máculas, pápulas, vesículas e crostas e tem aspecto polimorfo (em uma mesma região, lesões em vários estágios evolutivos), acomete mucosas e é pruriginoso.
  - Exantema maculopapular róseo, difuso, de distribuição craniocaudal que tende a confluir e desaparece no final da primeira semana. A transmissibilidade ocorre entre cinco a sete dias antes e até cinco a sete dias após o início do exantema.
  - Quadro clínico prodrômico de febre e irritabilidade, e dura de três a quatro dias. Após a normalização da temperatura, há início de exantema maculopapular, no tronco, que progride para região cervical e raiz dos membros, com duração de dois dias. Pode também apresentar edema periorbitário e geralmente não ocorre descamação da pele.
31. A história de dor abdominal, nas causas obstrutivas, pode vir associada à anorexia, náuseas, vômitos (alimentares, biliares ou fecalóides), e parada de eliminação de gases e fezes. É normalmente descrita como uma dor tipo cólica, seguida por períodos de remissão espontânea. O exame físico pode revelar distensão abdominal, aumento ou ausência dos ruídos hidroaéreos e timpanismo à percussão. A presença de massa palpável pode sugerir a etiologia da obstrução. As causas mais comuns (até 96% dos casos de obstrução) são:
- Aderência (50% a 70%), intussuscepção e volvo (15%), neoplasia (15%), hérnia encarcerada.
  - Neoplasias (50% a 70%), hérnia encarcerada (15%), aderência (15%), intussuscepção e volvo.
  - Hérnia Encarcerada (50% a 70%), intussuscepção e volvo (15%), neoplasia (15%), Aderência.
  - Aderência (50% a 70%), hérnia encarcerada (15%), neoplasia (15%), intussuscepção e volvo.

32. Segundo o Caderno de Atenção Básica de Acolhimento às Demandas, são características chave definitivas de dor torácica associada ao Infarto Agudo do Miocárdio:
- Dor precipitada pelo exercício, tempo frio ou estresse emocional; duração < 2-10 minutos.
  - Dor geralmente < 20min, menor tolerância para esforço.
  - Dor aguda, pleurítica agravada pelas modificações na posição; duração altamente variável.
  - Dor de início súbito, geralmente durando 30min ou mais. Frequentemente associado à dispneia, fraqueza, náuseas e vômitos. Pode haver alteração hemodinâmica.
33. A alcoolemia pode ser indicadora da quantidade de álcool ingerida, mas varia muito conforme as condições prévias do indivíduo que está sendo avaliado. Em indivíduos com alcoolemia de 0,30 a 0,39g/100ml, é possível observar sinais de:
- Inconsciência, Parada respiratória e Morte, em geral provocada por insuficiência respiratória.
  - Letargia profunda, Perda de consciência, Estado de sedação comparável ao de uma anestesia cirúrgica e Morte (em muitos casos).
  - Reflexos consideravelmente mais lentos, Problemas de equilíbrio e de movimento, Alteração de funções visuais, Fala arrastada e Vômito, sobretudo se esta alcoolemia for atingida rapidamente.
  - Entorpecimento fisiológico de quase todos os sistemas, Diminuição da atenção e da vigilância, reflexos mais lentos, dificuldade de coordenação e redução da força muscular, Sensação crescente de ansiedade e depressão, Redução da capacidade de tomar decisões racionais ou de discernimento e Diminuição da paciência.
34. Com relação à comunicação de eventos adversos e atendimentos aos usuários na Atenção Básica, leia as afirmativas abaixo que discorrem sobre a postura do Médico durante o atendimento e esclarecimento de informações e assinale a alternativa correta:
- Informar a má notícia, prognóstico e tratamento em linguagem clara, coloquial e em frases curtas, dar tempo para que a pessoa e sua família possam absorver cada informação e trazer dúvidas. É importante perguntar o que a pessoa compreendeu do que lhe foi dito. Se a conversa parece não ter sido bastante esclarecedora, novas perguntas abertas podem ajudar a restabelecer o fluxo de comunicação.*
  - Respeitar as manifestações emocionais do paciente, procurando suspender o julgamento sobre elas, especialmente quando nos incomodam. Este respeito pode ser manifesto por meio de sinais não verbais, mas uma assertiva verbal pode ser utilizada.*
  - Diante de uma pergunta que gera grande preocupação do usuário ou seu familiar, o Médico pode tender a ser evasivo ou mudar de assunto sem responder o que foi questionado.*
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
  - Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
  - Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
  - Todas as afirmativas estão corretas.
35. Nos casos de Parada Cardiorrespiratória, o profissional de saúde deve verificar rapidamente se não há respiração ou se a mesma é anormal (isto é, não respirando ou apenas com gasping) ao verificar a capacidade de resposta da vítima. Em seguida, o profissional deve acionar o serviço de emergência/urgência e buscar o desfibrilador (ou encarregar alguém disso). O profissional de saúde não deve levar mais do que:
- 20 segundos verificando o pulso e, caso não sinta o pulso em 20 segundos, deve iniciar a RCP e usar o desfibrilador, se disponível.
  - 10 segundos verificando o pulso e, caso não sinta o pulso em 10 segundos, deve iniciar a RCP e usar o desfibrilador, se disponível.
  - 20 segundos verificando o pulso e, caso não sinta o pulso em 20 segundos, deve iniciar a RCP e usar o desfibrilador após o primeiro ciclo de compressões e ventilações, se disponível.
  - 10 segundos verificando o pulso e, caso não sinta o pulso em 10 segundos, deve iniciar a RCP e usar o desfibrilador após o primeiro ciclo de compressões e ventilações, se disponível.
36. As elevações inadequadas da pressão arterial podem ser divididas inicialmente em três classes, quando existe risco de desenvolvimento de alguma complicação clínica associada ao aumento abrupto dos níveis pressóricos, caracteriza-se:
- Urgência Hipertensiva
  - Emergência Hipertensiva
  - Pseudocrise Hipertensiva
  - Crise Hipertensiva



37. A evolução da Hepatite B aguda, consiste em três fases, sendo que na fase prodrômica podemos observar:
- Desaparecimento da icterícia e retorno da sensação de bem-estar. A astenia pode persistir por vários meses.
  - Aparecimento de febre, astenia, dores musculares ou articulares e sintomas digestivos, tais como anorexia, náuseas e vômitos, perversão do paladar, às vezes cefaleia, repulsa ao cigarro.
  - Surgimento da icterícia que pode ser de intensidade variável, sendo, às vezes, precedida de colúria. A hipocolia pode surgir por prazos curtos, 7 a 10 dias, e às vezes se acompanha de prurido.
  - Os sintomas, quando presentes, são inespecíficos, predominando fadiga, mal-estar geral e sintomas digestivos. Uma parcela pode evoluir para cirrose, com aparecimento de icterícia, edema, ascite, varizes de esôfago e alterações hematológicas.
38. Segundo dados do II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, realizado em 2005 pelo CEBRID, com exceção do tabaco e do álcool, a droga citada como a de maior utilização entre os brasileiros é (são):
- A Maconha, com cerca de 8,8% de utilização entre os entrevistados.
  - Os anabolizantes, com cerca de 10,5% de utilização entre os entrevistados.
  - A Crack, com cerca de 5% de utilização entre os entrevistados.
  - Os Estimulantes, com cerca de 9,1% de utilização entre os entrevistados.
39. Os antipsicóticos têm sido frequentemente relacionados aos efeitos sexuais adversos, e cerca de 39% dos pacientes em uso dessas drogas referem queixa de interferência na esfera sexual. Em comparação com outros efeitos colaterais, como fadiga, ganho de peso e tremor, o efeito sobre a função sexual é considerado o mais problemático e importante razão de não aderência ao tratamento. Das queixas principais:
- O Transtorno do desejo hipoativo (TDH) é a queixa mais frequente em ambos os sexos.
  - O Transtorno da Aversão Sexual (TAS) é a queixa mais frequente em ambos os sexos.
  - A ejaculação precoce é a queixa mais frequente nos homens.
  - A disfunção orgasmática é a queixa mais frequente em ambos os sexos.
40. Acne, aumento do apetite, aumento de peso, fezes amolecidas, gosto metálico, náuseas, polidipsia, poliúria, tremor fino e convulsão são efeitos colaterais relacionados ao tratamento com:
- Carbamazepina.
  - Haloperidol decanoato.
  - Carbonato de Lítio.
  - Imipramina.

---

**DESTAQUE AQUI**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>